



## Instrucciones después de una colonoscopia

1. Después de este procedimiento, usted puede experimentar alguna de las siguientes condiciones:

- Exceso de gases
- Sensación de llenura (hinchazón)
- Calambres
- Malestar abdominal leve
- Pequeñas cantidades de sangrado rectal

2. Si experimenta algo de lo siguiente, infórmele al médico:

- Dolor abdominal severo que dura más de 1 hora
- Gran cantidad de sangrado rectal
- Fiebre o escalofríos

Otras instrucciones:




2005

Esta información está preparada específicamente para los pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico en los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a los individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene alguna pregunta acerca de la información presentada aquí, hable con un miembro de su equipo de atención médica.

¿Tiene preguntas acerca del Centro Clínico? [OCCC@cc.nih.gov](mailto:OCCC@cc.nih.gov)

*En donde sea aplicable, los nombres patentados de productos comerciales se proporcionan solamente como ejemplos ilustrativos de productos aceptables y no implica un respaldo por parte del NIH para dichos productos; ni tampoco el hecho de que el nombre de un producto de patente en particular no se identificó implica que dicho producto no sea satisfactorio.*

El Centro Clínico de los  
Institutos Nacionales de Salud  
Bethesda, MD 20892